



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2965 от « 30 » декабря 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

Идентификационный регистрационный, ОГРН, ФНС и/или Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН/ИП

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Овсюген Супер, КЭ (140 г/л феноксапроп-П-этила +
47 г/л антидота клоквинтосет-мексила)

получил государственную регистрацию за № 018-03-2965-1

на срок по « 29 » декабря 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№008358

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,4 0,4 (А)	Ячмень яровой (в том числе пивоваренный)	Виды <i>щетиinnика</i>	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании — 100-200 л/га, при авиационной обработке — 25-50 л/га	60(1)
0,4-0,6 0,4-0,6 (А)		Однолетние злаковые (виды <i>щетиinnика</i> , <i>куриное просо</i> , <i>просо сорное</i> , <i>овсюг</i>) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры) (с учетом чувствительности сортов). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании — 100-200 л/га, при авиационной обработке — 25-50 л/га	
0,3			Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, в ранние фазы их развития — 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости — 100-200 л/га	
0,4-0,6 0,4-0,6 (А)	Ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды <i>щетиinnика</i> , <i>куриное просо</i> , <i>просо сорное</i> , <i>овсюг</i> , <i>метлица полевая</i>) сорняки	Опрыскивание посевов весной, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения однолетних злаковых сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании — 100-200 л/га, при авиационной обработке — 25-50 л/га	

Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Овсюген Супер, КЭ (140 г/л феноксапроп-П-этила + 47 г/л антидота клокви́нтосет-мексила) от 30 декабря 2020 г. № 2965

1	2	3	4	5
0,3	Ячмень озимый	Однолетние злаковые (виды <i>щетинника</i> , <i>куриное просо</i> , <i>просо сорное</i> , <i>овсюг</i> , <i>метлица полевая</i>) сорняки	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам весной, в ранние фазы их развития – 2-3 листа, (независимо от фазы развития культуры) с добавлением 200 мл/га ПАВ Сателлит, Ж (900 г/л этоксилата изодецилового спирта). Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	60(1)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

