



МИНИСТЕРСТВО РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2499 от « 11 » декабря 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(индивидуальное предприятие, ОГРН, ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Титул Дуо, ККР (200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола)

(фунгицидный пестицид или агрохимикат)

получил государственную регистрацию за № 018-02-2499-1

на срок по « 10 » декабря 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 002847

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,25	Пшеница яровая, озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации в фазы появления флаг-листа - начало колошения; против фузариоза колоса в фазы конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	40(1-2)
0,25-0,32		Септориоз, пиренофороз		
0,32		Фузариоз колоса		
0,25	Ячмень яровой, озимый	Мучнистая роса, карликовая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
0,25-0,32		Темно-бурая пятнистость, сетчатая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз		
0,25	Рожь озимая	Мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, ринхоспориоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
0,3-0,4	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	
0,4-0,5	Подсолнечник	Альтернариоз, белая гниль, серая гниль, сухая ризопусная гниль корзинок, фомоз, фомопсис, септориоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней, но не позднее фазы конец бутонизации - начало цветения. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га	
0,32-0,4	Горох	Антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней, последующее - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	30(1-2)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Титул Дуо, ККР
(200 г/л пропиконазола + 200 г/л тебуконазола) от 11 декабря 2019 г. № 2499

1	2	3	4	5
0,4-0,5	Рапс яровой	Альтернариоз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивания стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	30(1)
0,4-0,5	Рапс озимый		Опрыскивание в период вегетации в фазы 6-8 листьев осенью и весной при появлении первых признаков одной из болезней в фазы вытягивание стеблей – начало образования стручков в нижнем ярусе. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	30(2)

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Копия для садоводов