



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 2134 от « 4 » марта 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(получившего Регистрацию, ОГРН, ФНО агрохимиката или пестицида, ОГРНП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Зингер, СП (600 г/кг метсульфурон-метила)

(агрохимикат или пестицид)

получил государственную регистрацию за № 018-03-2134-1

на срок по « 3 » марта 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений **Р.В. Некрасов**



М. П.



№002418

Для сельскохозяйственных производств:

Норма применения препарата, кг/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,008-0,01 0,008-0,01 (А)	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних двудольных сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазу розетки, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения зерновых. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200-300 л/га, авиационное опрыскивание – 25-50 л/га	60 (1)
0,008-0,01 0,008-0,01 (А)	Пшеница озимая, ячмень озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и в фазу розетки многолетних. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощи, подсолнечник и гречиху только после глубокой вспашки. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200-300 л/га, авиационное опрыскивание – 25-50 л/га	60 (1)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Зингер, СП
(600 г/кг метсульфурон-метила) от 4 марта 2019 г. № 2134

1	2	3	4	5
0,007-0,01 0,007-0,01 (А)	Лен – долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА и некоторые многолетние двудольные сорные растения	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Следует соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год нельзя высевать свеклу и овощи. Нельзя высевать гречиху и подсолнечник на следующий год, если pH почвы выше 7.5 или если была продолжительная засуха в период от применения препарата до посева этих культур. При необходимости посева обработанных гербицидом площадей можно высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости: наземное опрыскивание – 200-300 л/га, авиационное опрыскивание – 25-50 л/га	-(1)
0,1-0,2	Земли песельскохо- зяйственного назначения (охранные зоны линий	Однолетние и многолетние двудольные нежелатель- ные растения	Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности до начала цветения с целью формирования злакового покрова. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	-(1)
0,2-0,3	электропередач и просеки, трассы газо – и нефтепроводов, насыпи		Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности после начала цветения с целью формирования злакового покрова. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,15-0,2	и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог,	Борщевик Сосновского	Опрыскивание вегетирующих разновозрастных растений борщевика до бутонизации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	
0,04-0,05	аэродромы и промышлен- ные территории)		Опрыскивание вегетирующих однолетних растений борщевика. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Сроки безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

