



МИНсельхоз России

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1841 от « 22 » марта 2018 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(наименование Регистра, ОГРН, ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фаскорд, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-01-1841-1

на срок по « 21 » марта 2028 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№ 002070

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1-0,15	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание всходов Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	20(2)
0,1		Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20(2)
		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пиявица		
0,1-0,15	Ячмень	Пиявица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	45(2)
	Рапс, горчица (кроме горчицы на масле)	Рапсовый цветоед		
0,07-0,1	Картофель	Крестоцветные блошки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20(1)
0,1		Колорадский жук		
		Свекла сахарная, кормовая		
0,15-0,2	Горох овощной, горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в фазу бутонизации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	-(1)
	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли		
0,3	Пастбища, участки заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	28(1-2)
0,15-0,20	Кукуруза	Цикадки	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первой волны вредителей, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	28(1-2)
0,2-0,25		Кукурузный стеблевой мотылёк, луговой мотылёк, хлопковая совка, многоядные совки, тли		



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Фаскорд, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) от 22 марта 2018 г. № 1841

1	2	3	4	5
0,1-0,15	Лен масличный	Льняные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	35(1)
		Льняной трипс, льняная плодоярка, совка-гамма, люцерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	
0,1-0,15	Лен-долгунец	Льняные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	-(1)
		Льняной трипс, льняная плодоярка, совка-гамма, люцерновая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га	

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства,

механизации, химизации и защиты растений П.А. Чекмарев

