



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации пестицида или агрохимиката**

№ 2236

от « 21 » ноября 2011 г.

Настоящее свидетельство выдано ЗАО «Щелково Агрохим», 1025006519427

(наименование организации, ОГРН,

ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

агрохимикат Гумат калия «Суфлер» марки: ВР 2,5%, ВР 20%

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 2236-11-210-019-0-0-0-1

на срок по « 20 » ноября 2021 г. и допускается к обороту на территории Российской Федерации со следующими регламентами:

Для сельскохозяйственного производства:

Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
ВР 20%	10-20 л/га	Все культуры – внесение в почву перед вспашкой (культивацией)
	Расход рабочего раствора 800-1000 л/га	
	10-20 л/га	Рекультивация нарушенных земель
	Расход рабочего раствора 10 000-20 000 л/га	
	0,3 л/т	Зерновые культуры – предпосевная обработка семян
	Расход рабочего раствора 10 л/т	
	0,5-1,3 л/т	Зернобобовые, технические, масличные культуры – предпосевная обработка семян
	Расход рабочего раствора 10 л/т	
	1 л/т	Картофель – предпосадочная обработка клубней
	Расход рабочего раствора 40 л/т	
	100-125 мл/кг	Овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры – замачивание семян на 24 часа
	Расход рабочего раствора 1 л/кг	
	0,25-0,3 л/га	Пшеница озимая и яровая, ячмень, овес, гречиха и др. зерновые культуры – некорневая подкормка в фазе кущения – начала выхода в трубку и в фазе цветения – начала молочной спелости
	Расход рабочего раствора 50-300 л/га	
	0,25-0,3 л/га	Кукуруза – некорневая подкормка в фазе всходов – появления 3-5 листьев и в фазе выметывания метелки – цветения
	Расход рабочего раствора 50-300 л/га	Рис – в фазе кущения – начала выхода в трубку, в фазе цветения – начала молочной спелости
		Свекла сахарная – в фазе 2-3 пар листьев и в фазе 4 пар листьев
		Соя – в фазе начала цветения и через 10-15 дней
		Картофель – в фазе 5-7 листьев и в фазе бутонизации
		Подсолнечник – в фазе 3-4 листьев и через 10-15 дней
		Томат, огурец – после высадки рассады или в период формирования 2-3 листьев (при безрассадном способе выращивания) и через 10-20 дней
		Морковь и др. столовые корнеплоды – в фазе 2-3 листьев и через 10-20 дней
		Капуста – через 3-5 дней после высадки рассады и через 10-12 дней
		Бахчевые культуры (арбуз, дыня и др.) – в период формирования 2-3 листьев (при безрассадном способе выращивания) и через 10-20 дней

Для личных подсобных хозяйств:

Марка	Доза применения	Культура, время, особенности применения
ВР 2,5%	50-100 мл/л воды	Овощные, цветочно-декоративные, плодово-ягодные культуры – замачивание семян перед посевом на 24 часа, клубней и луковиц на 10-12 часов
	50-100 мл/10 л воды Расход раствора: корневая подкормка – 3-10 л/м ² ; некорневая подкормка – 1,5-3 л/100 м ²	Все культуры – подкормка в период вегетации – 2-6 раз
	5-10 мл/л воды Расход раствора: при опрыскивании – до увлажнения листовой поверхности растений, при поливе – до увлажнения земляного кома	Цветочно-декоративные культуры (горшечные) – подкормка в период активного роста с марта по сентябрь – 1 раз в 10-15 дней, с октября по февраль – 1 раз в 1-1,5 месяца



Заместитель Руководителя Россельхознадзора

(подпись)

А.И. Саурин
(Ф.И.О.)