



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2221 от « 7 » мая 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(наименование Регистра, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Кинфос, КЭ (300 г/л диметоата + 40 г/л бета-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-01-2221-1

на срок по « 6 » мая 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,  
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



№ 002531



**Для сельскохозяйственного производства:**

| Для сельскохозяйственного производства: |                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Норма применения препарата, л/га        | Культура                                                        | Вредный объект                             | Способ, время обработки, особенности применения                                                                                                                             | Срок ожидания (кратность обработок) |
| 0,5                                     | Пшеница                                                         | Хлебная жужелица                           | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га                                                                                                                | 30(1)                               |
| 0,15-0,25                               |                                                                 | Вредная черепашка                          | Опрыскивание в период вегетации.                                                                                                                                            | 20(1)                               |
| 0,15-0,2                                | Ячмень, овес                                                    | Пьявицы                                    | Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га                                                                                                                                      |                                     |
|                                         | Картофель                                                       | Колорадский жук                            |                                                                                                                                                                             |                                     |
| 0,3-0,4                                 | Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность | Саранчовые                                 | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 7 дней после обработки. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | -(1)                                |
| 0,3                                     | Соя                                                             | Соевая плодожорка, луговой мотылек         | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га                                                                                                     | 21(1)                               |
| 0,3-0,5                                 |                                                                 | Обыкновенный паутинный клещ                |                                                                                                                                                                             |                                     |
| 0,25-0,4                                | Свекла сахарная                                                 | Свекловичные блошки, долгоносики           | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га                                                                                                                | 40(2)                               |
| 0,25                                    |                                                                 | Свекловичный долгоносик-стеблелеед         | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га                                                                                                     |                                     |
|                                         |                                                                 | Свекловичная листовая тля, луговой мотылек |                                                                                                                                                                             |                                     |
| 0,25                                    | Подсолнечник                                                    | Луговой мотылек                            | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га                                                                                                      | 60(2)                               |
| 0,25-0,4                                |                                                                 | Капустная и хлопковая совки                |                                                                                                                                                                             |                                     |
|                                         |                                                                 | Подгрызающие совки                         | Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га                                                                                                                |                                     |



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Кинфос, КЭ  
(300 г/л диметоата+40 г/л бета-циперметрина) от 7 мая 2019 г. № 2221

| 1        | 2                    | 3                                                       | 4                                                                           | 5     |
|----------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0,25     | Кукуруза             | Луговой мотылек                                         | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости -200-400 л/га   | 60(2) |
| 0,25-0,4 |                      | Хлопковая совка, кукурузный стеблевой мотылек, цикадки  |                                                                             |       |
|          |                      | Подгрызающие совки                                      | Опрыскивание всходов.<br>Расход рабочей жидкости -100-200 л/га              |       |
| 0,25-0,4 | Горох                | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости -200-300 л/га   | 21(1) |
|          | Нут                  | Хлопковая совка, нутзовый минер                         |                                                                             |       |
| 0,4-0,5  | Яблоня               | Яблонная плодожорка, листовертки                        | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 600-1500 л/га | 21(2) |
|          | Груша                | Грушевая медяница                                       |                                                                             |       |
| 0,3-0,5  | Виноград             | Гроздевая листовертка                                   | Опрыскивание в период вегетации.<br>Расход рабочей жидкости - 500-1200 л/га | 60(2) |
|          |                      | Коричнево-мраморный клоп                                |                                                                             | -(3)  |
|          | Мандарин (питомники) |                                                         |                                                                             |       |

Запрещается применение препарата в водоохранной зоне водных объектов, авиационным методом, в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ – 4 дня.

Директор Департамента растениеводства, механизации,

химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

