



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА**

№ 864 от « 16 » октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано
АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(заполняется Регистратом, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда+120 г/л альфа-циперметрина)
(каждое наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-01-864-1

на срок по « 15 » октября 2025 г. и допускается к обороту на
территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, химизации
и защиты растений П.А. Чекмарев


(подпись)



№ 000972

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,15-0,25	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	20(2)
0,1	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
	Пшеница, ячмень	Хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га	
	Ячмень	Злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах, в водоохранной зоне водных объектов; авиационным методом.





МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 128 от « 30 » марта 2016 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 864 от « 16 » октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано АО «Целково Агрохим»,

ОГРН 1025006519427

(наименование организации, ОГРН,

ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда+120 г/л альфа-циперметрина)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-01-864-1/128 на срок по
« 15 » октября 2025 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений
П.А. Чекмарев


(подпись)



№000152

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,15-0,25 (А)	Пшеница озимая	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	20(2)
0,1(А)	Пшеница	Вредная черепашка, злаковые тли, пшеничный трипс, хлебные жуки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	
	Ячмень	Злаковые тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Запрещается применение препарата:

в личных подсобных хозяйствах;

в водоохранной зоне водных объектов.





МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 202 от « 21 » ноября 2017 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 864 от « 16 » октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

ОНО выдано в качестве приложения к свидетельству, ОГРН 1025006519427

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина)
(наименование пестицида или агрохимиката)

018-01-864-1/202

получили государственную регистрацию за № _____ на срок по
« 15 » октября 2025 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А. Чекмарев



№ 000248

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применение препарата л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения препарата	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1	Пшеница	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	20(2)
0,1 (А)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	
0,1	Ячмень	Злаковые мухи, пьявицы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	
0,1 (А)			Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 25-50 л/га	

Запрещено применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.





МИНИСТЕРСТВО РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 237 от « 10 » июля 2018 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 864 от « 16 » октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано АО «Шелково Агрохим»,
ОГРН 1025006519427

(наименование организации, ОГРН,

ФНКО аккредитованного производителя, ОГРН-ИИИ)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

018-01-864-1/237

получил государственную регистрацию за № _____ на срок по
« 15 » октября 2025 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений И.А. Чекмарев



№ 000289



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения.	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,15-0,2	Кукуруза	Подгрызающие совки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	30(2)
0,15 – 0,2 0,15 – 0,2 (А)		Кукурузный стеблевой мотылек, хлопковая совка, цикадки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Луговой мотылек, тли		
0,1-0,2 0,1-0,2 (А)		Коричнево-мраморный клоп		
0,1-0,15	Рапс яровой и озимый	Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га	34(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Рапсовый пилильщик, скрытнохоботник рапсовый семенной, рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	
0,15-0,2 0,15-0,2 (А)		Капустная моль		
0,15-0,2 0,15-0,2 (А)	Подсолнечник	Хлопковая совка, капустная совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	31(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Луговой мотылек		
0,15-0,2 0,15-0,2 (А)	Горох	Гороховая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	14(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Гороховая зерновка, гороховая тля		
0,15-0,2 0,15-0,2 (А)	Соя	Хлопковая совка, соевая плодожорка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	30(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Акациевая (бобовая) огневка, луговой мотылек		
0,1-0,15	Свекла сахарная	Свекловичные долгоносики, свекловичные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	21(2)
0,1-0,15 0,1-0,15 (А)		Свекловичная листовая тля, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационном применении – 25-50 л/га	21(2)
0,2-0,3 0,2-0,3 (А)		Свекловичный долгоносик-стеблеед		

Запрещено применение препарата: в личных подсобных хозяйствах; в водоохранной зоне водных объектов.

Срок безопасного выхода на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.





МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

ДОПОЛНЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ И(ИЛИ) РЕГЛАМЕНТОВ
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 340 от « 9 » февраля 2021 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДА ИЛИ
АГРОХИМИКАТА

№ 864 от « 16 » октября 2015 г.

Настоящее свидетельство выдано АО «Целково Агрохим»,

ОГРН 1025006519427

(информационное свидетельство ОГРН,

ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-
циперметрина)
(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-01-864-1/340 на срок по
« 15 » октября 2025 г. и допускается к обороту на территории
Российской Федерации со следующими измененными сферой и(или) регламентами
применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№ 000406

Для сельскохозяйственного производства и в условиях лесного хозяйства:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,05-0,07 0,05-0,07 (А)	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик-ткач, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: при наземном применении – 100-200 л/га, при авиационном – 3-25 л/га	-(1)
0,07			Опрыскивание в период развития гусениц, личинок и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Ширина эффективного захвата – 140-480 м. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/га	
0,05-0,07 0,05-0,07 (А)	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: при наземном применении – 100-200 л/га, при авиационном – 3-25 л/га	-(2)



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина) от 9 февраля 2021 г. № 340

1	2	3	4	5
0,07	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго с использованием генератора аэрозольного регулируемой дисперсности «ГАРД». Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 3 дней после обработки. Сбор дикорастущих грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Ширина эффективного захвата – 140-480 м. Расход рабочей жидкости – 1-3 л/га	-(1)
0,1-0,2	Нут	Хлопковая совка, нутовый минер, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	14(2)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма расхода препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
1 мл/10 л воды	Хвойные породы	Хвоегрызущие вредители: сибирский коконопряд, звездчатый пилильщик, рыжий сосновый пилильщик	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево	-(1)

Директор Департамента растениеводства, механизации и защиты растений Р.В. Некрасов



Приложение № 2 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Эсперо, КС (200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-циперметрина) от 9 февраля 2021 г. № 340

1	2	3	4	5
1 мл/10 л воды	Лиственные породы	Листогрызущие и сосущие вредители: блошак дубовый, дубовый клоп-кружевница	Опрыскивание в период развития личинок и имаго. Расход рабочей жидкости – 2-5 л/дерево	-(2)

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных и ручных работ, включая личные подсобные хозяйства – 3 дня.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

