



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2300 от « 1 » июля 2019 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково-Агрохим», ОГРН 1025006519427

(наименование Регистрации, ОГРН, ФНО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Индиго, КС (345 г/л меди сульфата трехосновного)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 018-02-2300-1

на срок по « 30 » июня 2029 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
3,0-5,0	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу «зелёный конус», последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	15(4)
4,0-6,0	Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	20(4)
		Милдью	Опрыскивание в период вегетации первое – профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	
4,0-5,0	Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации – первое при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	7(4)

Для личных подсобных хозяйств:

Норма применения препарата	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
30-50 мл/ 10 л воды	Яблоня, груша	Парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации – первое в фазу «зелёный конус», последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ² или 2-5 л/дерево	15(4)
40-60 мл/ 10 л воды	Виноград	Серая гниль, чёрная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	20(4)
		Милдью	Опрыскивание в период вегетации – первое профилактическое; последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ²	



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации пестицида Индиго, КС (345 г/л меди сульфата трехосновного) от 1 июля 2019 г. № 2300

1	2	3	4	5
40-50 мл/ 10 л воды	Персик, вишня, слива, черешня	Монилиоз, кластероспориоз, курчавость листьев	Опрыскивание в период вегетации – при появлении первых признаков болезней (до цветения); последующие – с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м ² или 2-5 л/дерево	7(4)

Сроки безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных и ручных работ, включая личные подсобные хозяйства – 3 дня.

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов.

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

