



МИНИСТЕРСТВО РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 1449 от « 07 » апреля 2017 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «Щелково Агрохим», ОГРН 1025006519427

(индивидуальное предприятие, ООО, ОАО, ЗАО, ООО с ограниченной ответственностью, ООО с ограниченной ответственностью, ООО с ограниченной ответственностью)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Фенизан, ВР (360 г/л динамбы кислоты+22,2 г/л хлорсульфурона
кислоты (диэтилэтаноламинные соли))

получил государственную регистрацию за № 018-03-1449-1
на срок по « 06 » апреля 2027 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений П.А.Чекмарев



№001645



Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения препарата (л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность)
1	2	3	4	5
0,14-0,2 0,14-0,2 (А)	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние сорняки	Опрыскивание посевов в фазе начала кущения культуры (3-4 листа) - конец кущения и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га	60(1)
	Пшеница озимая, ячмень озимый, рожь озимая	двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной или осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га	
0,14-0,2 0,14-0,2 (А)	Пшеница и ячмень яровые и озимые, овес, рожь озимая	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае крайней необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Не применять позднюю обработку на семеноводческих и селекционных посевах. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га	60(1)
	Лен масличный, лен долгунец	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе елочки (высота культуры 3-10 см) и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости: при наземной обработке - 200-300 л/га, при авиационной - 25-50 л/га	

Запрещается применение препарата: в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные поля для проведения механизированных работ – 3 дня.

